

ラウンドから考える手指衛生剤の在り方

医療監視を受けるにあたり、各セクションのラウンドを行いました。

質問形式における、手指衛生の方法やタイミングについては、きちんと解答できていましたが、残念なことに、手指消毒の開封日の記載がなかったり、使用期限を越えたものが数か所で使用されていました。

使用期限は、“開封後6か月”

<対策>

- ① 職員用は使用頻度の多い場所に設置しましょう
- ② ベッドサイドへは、手指衛生剤を持参しましょう
- ③ 個室前などの使用頻度の少ない手指衛生剤は、場所を移動させて有効に使用しましょう。

手指衛生剤を、有効に使用・活用することで院内感染対策の充実を図りましょう!!!



患者・面会者が使用

手指衛生の頻度が高く、手あれが懸念される医療従事者が使用



WHOの5つの手指衛生のタイミング


感染症情報トピックス

<風しん>

今年の患者数は2008年以降で最多となっており、人口あたりの患者数は**兵庫県が全国で最多**となっています。

風しんは、妊婦が罹患すると先天性風疹症候群児が出生する可能性があり、その対策が重要となります。今年の流行の中心である成人男性は、ワクチン接種を受けていない人が多く、ワクチン接種が風しん流行に歯止めをかける唯一の対策となります。

- ① 妊婦がいる家庭はワクチン接種を積極的に行う
- ② 中学1年と高校3年に相当する年齢の人にMRワクチン（麻疹・風疹）を確実に接種させる（公費）



<夏でもあるインフルエンザ>

2011/2012 シーズン夏季におけるA/H3N2型インフルエンザウィルスの流行—沖縄

沖縄県では、2005年以降冬季のみならず夏季にもインフルエンザ流行が認められるようになり、2011/2012 シーズンにおいても冬季流行後に終息することなく、再び夏季のインフルエンザ流行が認められています。

<職員のインフルエンザワクチン接種>

今年も10月末から職員へのインフルエンザワクチンの接種が始まります。（詳細は後日）

毎年、流行時にはインフルエンザに罹患された患者さまが多数来院されます。病院が極めて多忙なこの時期に、職員がインフルエンザに罹患して欠勤し、患者サービスの低下を招かないよう、また患者さまへの感染源にならないように万全の対策を取りましょう。

今年もインフルエンザワクチンを接種しましょう!!!

妊婦、授乳婦の方も安心して接種できます。卵アレルギーの方は接種できないことがあります。医師に相談してください。