

院内感染対策〇×クイズ




全問題数 16問

何問正解できるかな・・・??

第1問


- 結核患者には、N95マスクを着用してもらい飛散を防ぐ



結核患者には、サージカルマスクを着用
してもらいます

第2問

- 麻疹患者に対応するときは、サージカルマスクを着用する




麻疹は空気感染します

対応するスタッフはN95マスクを着用してください


第3問

- バンコマイシンの点滴は、1時間以上かけてゆっくりと行うとよい



第4問

- TDM採血は早朝がよい




バンコマイシン投与直前の血中濃度(トラフ値)が重要です。

バンコマイシン投与直前に採血してください。


第5問

- HBs抗原陽性血液の針刺しをした場合、HBワクチン接種により抗体(+)であれば感染の心配はない



第6問


- 血液培養は、高熱が落ち着いてから採血を行う



38度以上の発熱時、36度以下の低体温時や
悪寒時に採血を行いましょう
必ず医師の指示を確認して下さい

第7問


- 喀痰検査時の喀痰採取は、含嗽をしてから行う



口腔内は、常在細菌が多数存在しているので、
常在菌数を減らすために実施します

第8問


- 手袋を装着していれば、手洗いの必要性はない



手袋には、穴が開いている可能性があります
また、脱ぐ時に汚染している可能性がありますので、
手袋を脱いだあとも手指衛生を行いましょう

第9問


- MRSA患者の部屋に入室時は、まだ手指が汚染されいないので手指消毒しなくてもよい



MRSA患者の部屋の入室時には、詰所・カルテ・パソコンなどに付着しているかもしれない菌を患者に運ぶ可能性があるので手指衛生を行いましょう

第10問

- 給食は、調理後1時間以内に食べるようにする




給食は、調理されてから2時間以内に食べることが
基本です

配膳されたら出来るだけ早く食事するよう説明しましょう


第11問

- 咳の多い外来患者は、希望すればマスクを20円で購入することができる。



第12問


- インフルエンザに罹患したとき、マスクを着用していれば勤務に支障はない。



罹患した場合は、解熱後48時間経過してからの
勤務になります
解熱しても感染源となる可能性はあるので、
発症後10日間はマスクを着用して下さい

第13問


- インフルエンザに罹患した場合、解熱すれば他人にうつす危険性はない。



解熱しても、8割以上はウィルスが残っている
ので、感染源となる可能性があります

第14問


- タミフルは、熱や症状が治まれば飲み残して、家族がインフルエンザになった時まで保管しておく。



内服は、症状が治まっても5日間しっかりと
飲み切ってください

第15問


- 1日2回の抗菌薬の点滴指示は10時、16時の通常点滴時間でよい。



抗菌薬の点滴は、出来る限り12時間おきに
投与する方が効果が良い

第16問

- 点滴中にルートが外れた場合、外れたルートは消毒してそのまま刺しなおせば良い。



外れたルートは汚染している可能性が高いです
きちんと交換しましょう