

薬剤種	薬剤名称1 (画面表示名称)	院外区分	限定区分
2:外用薬	「純生」d l -カンフル	0:通常	
2:外用薬	「純生」ミヨウバン	0:通常	
2:外用薬	0.5%ヒビテン液 500ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	1% ポリコナゾール点眼液 5ml (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	0:通常	
2:外用薬	5%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	2:院内不可薬	
2:外用薬	5-FU軟膏5%協和 5g	2:院内不可薬	
2:外用薬	AZ点眼液0.02%(先発無)	2:院内不可薬	
2:外用薬	Mohsペースト 50g (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	MS冷シブ「タイリ」(スフケノールA) 100g/袋	2:院内不可薬	
2:外用薬	NS軟膏	0:通常	
2:外用薬	PA・ヨード点眼・洗眼液 20ml	0:通常	
2:外用薬	SPTロ-チ明治(先発無)	0:通常	
2:外用薬	VCスティック (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	Vit. C誘導体ローション(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	アイオピジン1% 0.1ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	アイファガン点眼液0.1% 5ml	0:通常	
2:外用薬	アイベータ配合点眼液 5ml	0:通常	
2:外用薬	アイラミド配合懸濁性点眼液 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	アクアチムクリーム 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	アクアチムローション 20ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	アクトシン軟膏3% 30g	0:通常	
2:外用薬	アクロマイシン軟膏3% 5g	0:通常	
2:外用薬	アジマイシン点眼液1% 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	アスコルビン酸(試薬特級)	1:院外不可薬	
2:外用薬	アズノールうがい液4% 5ml(先発無)	0:通常	
2:外用薬	アズノールシカイン含嗽水(院内) 500ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	アズノール亜鉛華単軟膏(等量)	0:通常	
2:外用薬	アズノール軟膏0.033% 20g	0:通常	
2:外用薬	アセモトール	2:院内不可薬	
2:外用薬	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	0:通常	
2:外用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	0:通常	
2:外用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	2:院内不可薬	
2:外用薬	アドフィードバップ40mg (1袋=7枚)	0:通常	
2:外用薬	アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	0:通常	
2:外用薬	アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	2:院内不可薬	
2:外用薬	アノーロエリプタ30吸入用	0:通常	
2:外用薬	アフタッチ 25μg	2:院内不可薬	
2:外用薬	アポハイドロ-ション20% 4.32g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	アラセナA軟膏3% 5g	0:通常	
2:外用薬	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	2:院内不可薬	
2:外用薬	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	2:院内不可薬	
2:外用薬	アルピニー坐剤 100mg	2:院内不可薬	
2:外用薬	アルピニー坐剤 200mg	0:通常	
2:外用薬	アルメタ軟膏 5g	2:院内不可薬	
2:外用薬	アレサガテープ4mg	2:院内不可薬	
2:外用薬	アレジオンLX点眼液0.1% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2:院内不可薬	
2:外用薬	アンテベートローション10g	0:通常	
2:外用薬	アンテベート軟膏0.05% 5g	0:通常	
2:外用薬	アンベック坐剤 20mg	0:通常	
2:外用薬	イオウ・カンフルローション「東豊」	2:院内不可薬	
2:外用薬	イソジンガー-グル液7% 30ml	2:院内不可薬	

2:外用薬	イソジゲル10% 20g	0:通常	
2:外用薬	イソジン液 10%	2:院内不可薬	
2:外用薬	イソジン液 (耳浴用)	2:院内不可薬	
2:外用薬	イナビル吸入粉末剤 20mg 20mg/個	0:通常	
2:外用薬	イムノブラダー勝注用80mg (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	インタール吸入液 1%アンプル	2:院内不可薬	
2:外用薬	インテバンクリーム 50g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ウルティプロ吸入用カプセル	0:通常	
2:外用薬	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	エイベリス点眼液0.002% 2.5ml/本	0:通常	
2:外用薬	エキザルベ 5g	0:通常	
2:外用薬	エクラプラスター20µg/cm ²	2:院内不可薬	
2:外用薬	エクロックゲル 5% (ツイストボトル) 40g	2:院内不可薬	
2:外用薬	エコリシン眼軟膏	2:院内不可薬	
2:外用薬	エスクレ坐剤 250mg	0:通常	
2:外用薬	エストラーナテープ 0.72mg	2:院内不可薬	
2:外用薬	エストリール膣錠 0.5mg	0:通常	
2:外用薬	エタノール (50%) 耳浴用	0:通常	
2:外用薬	エタプラス 500ml	0:通常	
2:外用薬	エナジア吸入用カプセル中用量	0:通常	
2:外用薬	エピデュオゲル 15g	2:院内不可薬	
2:外用薬	エムラクリーム 5g/本	0:通常	1:患者限定
2:外用薬	エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用	2:院内不可薬	
2:外用薬	オイラックスクリーム 10%	0:通常	
2:外用薬	オキス9µgタービ`1ハイ-60吸入	2:院内不可薬	
2:外用薬	オキサロール軟膏 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	オキシドール「ケンエー」	0:通常	
2:外用薬	オキナゾール膣錠 600mg	0:通常	
2:外用薬	オスバン液 10%	0:通常	
2:外用薬	オリーブ油 (消毒用)	0:通常	
2:外用薬	オリーブ油 (点鼻用)	0:通常	
2:外用薬	オリーブ油 (塗布用)	0:通常	
2:外用薬	オロパタジン点眼液0.1%「ニット-」(ハタノール)5ml	0:通常	
2:外用薬	オンプレス吸入用カプセル150µg	2:院内不可薬	
2:外用薬	ガチフロ点眼液0.3% 5ml	0:通常	
2:外用薬	カデックス軟膏 0.9% 40g	0:通常	
2:外用薬	カデックス軟膏分包45mg 5g/枚	0:通常	
2:外用薬	カンフル精「ヤマゼン」	0:通常	
2:外用薬	キサラタン点眼液 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	キシロカインゼリー 2% 30ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	キシロカインポンプスプレー80g(先発無)(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	キシロカイン液 4%眼科用 5ml	0:通常	
2:外用薬	キュバル50エアゾール	2:院内不可薬	
2:外用薬	グラアルファ配合点眼液 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	グラナテック点眼液 0.4% 5ml	0:通常	
2:外用薬	クラビット点眼液 0.5% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	クラビット点眼液 1.5% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	グリセリン	0:通常	
2:外用薬	グリセリン・RO水 30ml/本	1:院外不可薬	
2:外用薬	グリセリン浣腸液 50%「ケイ」 120ml(東豊)	2:院内不可薬	
2:外用薬	グリセリン浣腸液 50%「ケイ」 60ml(東豊)	0:通常	
2:外用薬	クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本	0:通常	
2:外用薬	クロマイ膣錠 100mg	0:通常	
2:外用薬	ゲーバンクリーム 1%	0:通常	
2:外用薬	ケトコナゾールクリーム2%「JG」10g (コソール)	0:通常	

2:外用薬	ケトコナゾールローション2%「JG」10g (コナール)	0:通常	
2:外用薬	ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」(ザジテン)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ケトロフィンテープ 20mg「日医工」(モラステープ)7枚/袋	0:通常	
2:外用薬	ケラチナミンコーワクリーム20% 25g	0:通常	
2:外用薬	ゲンタシン軟膏0.1% 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ」(ゲンタシン)10g	0:通常	
2:外用薬	ゴソプトミニ配合点眼液	0:通常	
2:外用薬	ゴソプト配合点眼液 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	コムクロシャンプー-0.05% 125g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	コムレクス耳科用液1.5%	2:院内不可薬	
2:外用薬	コリナコール点眼液 (先発無)	0:通常	
2:外用薬	コレクチム軟膏0.5% 5g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	サイブレジン点眼液 10ml	0:通常	
2:外用薬	ザジテン点鼻液0.05%	2:院内不可薬	
2:外用薬	ザラカム配合点眼液 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	サリチル酸	2:院内不可薬	
2:外用薬	サリベートエアゾール	0:通常	
2:外用薬	ザルコニン液0.025 5L(オスパン)	0:通常	
2:外用薬	サルタノールインヘラー 100μg	2:院内不可薬	
2:外用薬	サンコバ点眼液	0:通常	
2:外用薬	サンピロ点眼液 1%	0:通常	
2:外用薬	サンピロ点眼液 2%	0:通常	
2:外用薬	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点眼) 5ml	0:通常	
2:外用薬	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点耳) 5ml	0:通常	
2:外用薬	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点鼻) 5ml	0:通常	
2:外用薬	シープリ吸入用カプセル50μg	0:通常	
2:外用薬	シロチルジウムスルホサリチン点眼液5%「CEO」10ml	0:通常	
2:外用薬	ジクアホソルNa点眼液3%「ニット」(ジクアス) 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ジクアスLX点眼液3% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ジクアス点眼液 3%	0:通常	
2:外用薬	ジクトルテープ75mg	0:通常	
2:外用薬	ジクロリフェナクNaゲル1%「日本臓器」(ホルタレナゲル) 50g	0:通常	
2:外用薬	ジフルカン点眼液 5ml (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	シムビコートタービューヘイラー 60吸入	2:院内不可薬	
2:外用薬	スタデルムクリーム5% 10g	0:通常	
2:外用薬	スタデルム軟膏 10g	0:通常	
2:外用薬	スチックゼノールA 40g	0:通常	
2:外用薬	ステリクロンRエタノール液0.5 500ml	0:通常	
2:外用薬	ステリクロンR液0.5 500ml	0:通常	
2:外用薬	ステリクロンW液0.02% (先発無)	0:通常	
2:外用薬	ステロネマ注腸3mg (先発無)	0:通常	
2:外用薬	スピール膏M	2:院内不可薬	
2:外用薬	スピオルトレスピマツト 60吸入	0:通常	
2:外用薬	スピリーバ2.5μgレスピマツト 60吸入	0:通常	
2:外用薬	スプレキア点鼻液0.15%	2:院内不可薬	
2:外用薬	スミスリンローション5% 30g	0:通常	
2:外用薬	ゼビアックスローション2% 10g/本	0:通常	
2:外用薬	セフトラジウム点眼液 5ml (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	ゼフナートクリーム 10g	0:通常	
2:外用薬	ゼフナート外用液 10ml	0:通常	
2:外用薬	ゼベリン点眼液0.1%	2:院内不可薬	
2:外用薬	セルタッチパップ140 (1袋=7枚)	2:院内不可薬	
2:外用薬	セルタッチパップ70 (1袋=7枚)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ゾビラックス眼軟膏 5g	0:通常	
2:外用薬	ソフラチュール貼付剤 10cm	0:通常	

2:外用薬	ダイアップ坐剤 6mg/個	0:通常	
2:外用薬	ダイアップ坐剤 10mg/個	0:通常	
2:外用薬	タコシール組織接着用シート ハーフサイズ	1:院外不可薬	
2:外用薬	タブコム配合点眼液 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	タブロスミ二点眼液0.0015% 0.3ml/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	タブロス点眼液0.0015% 2.5ml	0:通常	
2:外用薬	ダラシンTゲル1%10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g	0:通常	
2:外用薬	タリビッド耳科用液0.3% 5ml	0:通常	
2:外用薬	タリムス点眼液0.1% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	タルク	2:院内不可薬	
2:外用薬	チオ硫酸ナトリウム	0:通常	
2:外用薬	チモプトールXE点眼液0.5% 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	チモプトール点眼液0.5% 5ml	0:通常	
2:外用薬	チモロールPF点眼液0.5% (珪酸トール)	2:院内不可薬	
2:外用薬	チモロールXE点眼液0.5%「ニット」2.5ml (珪酸トール)	0:通常	
2:外用薬	ツロパテールテブ 0.5mg「YP」(軟化リテーブ)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ツロパテールテブ 1mg「YP」(軟化リテーブ)	0:通常	
2:外用薬	ツロパテールテブ 2mg「YP」(軟化リテーブ)	0:通常	
2:外用薬	ディフェリンゲル0.1% 15g	2:院内不可薬	
2:外用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g	0:通常	
2:外用薬	デスマブレシン・スプレー10協和	2:院内不可薬	
2:外用薬	デタントール0.01%点眼液 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	デュアック配合ゲル 10g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	デュオトラバ配合点眼液 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	テラコートリル軟膏 5g	0:通常	
2:外用薬	テルリジー100エリプタ14吸入用	1:院外不可薬	
2:外用薬	テルリジー100エリプタ30吸入用	2:院内不可薬	
2:外用薬	デルモベートクリーム0.05% 5g	0:通常	
2:外用薬	デルモベート軟膏0.05% 5g	0:通常	
2:外用薬	デルモベートスカルプローション0.05% 10g	0:通常	
2:外用薬	テレミンソフト坐薬 10mg	0:通常	
2:外用薬	トプシム軟膏0.05% 5g	2:院内不可薬	
2:外用薬	トブラシン点眼液 5ml	0:通常	
2:外用薬	ドボベットゲル 15g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ドボベットフォーム 60g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ドボベット軟膏 15g	0:通常	
2:外用薬	トラバタンズ点眼液0.004% 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	トルソプト点眼液1% 5ml	0:通常	
2:外用薬	ドルモロール配合点眼液「ニット」(ソフト) 5ml	0:通常	
2:外用薬	トロンビン液モチダ (ソフトボトル) 5千	0:通常	
2:外用薬	ナウゼリン坐剤 10mg	2:院内不可薬	
2:外用薬	ナウゼリン坐剤 30mg	0:通常	
2:外用薬	ナウゼリン坐剤 60mg	0:通常	
2:外用薬	ニコチネルTTS 10cm ²	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニコチネルTTS 20cm ²	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニコチネルTTS 30cm ²	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニゾラルクリーム10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニゾラルローション2% 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニトログリセリンテープ27mg「ト」(ニトグー)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニフラン点眼液 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ニュープロパッチ 4.5mg	0:通常	
2:外用薬	ニュープロパッチ13.5mg	0:通常	
2:外用薬	ネオキシテープ73.5mg 7枚/袋	0:通常	
2:外用薬	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10ml	0:通常	

2:外用薬	ネオメドロールE E軟膏 3g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ネリヅナユニバーサルクリーム10g	0:通常	
2:外用薬	ハイドロキノン親水軟膏5%(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	ハイバジールコーワ点眼液0.25% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	バクスマー点鼻粉末剤 3mg	2:院内不可薬	
2:外用薬	バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	0:通常	
2:外用薬	バスタロンクリーム20% 25g	2:院内不可薬	
2:外用薬	パタノール点眼液0.1% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ハッカ油「ケンエー」	0:通常	
2:外用薬	パッチテストパネル(S)	1:院外不可薬	
2:外用薬	パピロックミニ点眼液0.1%	2:院内不可薬	
2:外用薬	ハール ワッサー	2:院内不可薬	
2:外用薬	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	2:院内不可薬	
2:外用薬	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	0:通常	
2:外用薬	バンコマイシン点眼液 5ml (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	パンデルローション0.1%	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニット」(ヒアレイン)	0:通常	
2:外用薬	ヒアレインミニ0.3	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0:通常	
2:外用薬	ヒアレイン点眼液0.1%	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒアレイン点眼液0.3%	2:院内不可薬	
2:外用薬	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	0:通常	
2:外用薬	ビソノテープ2mg	0:通常	
2:外用薬	ビソノテープ4mg	0:通常	
2:外用薬	ビソノテープ8mg	0:通常	
2:外用薬	ビソルボン吸入液0.2% 4.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒドロキノン軟膏7.5%(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	ヒドロキノン軟膏10%(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	ヒビテン液[5%]	2:院内不可薬	
2:外用薬	ピマリシン点眼5% 5ml	0:通常	
2:外用薬	ヒルドイドクリーム0.3% 25g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒルドイドフォーム0.3% 92g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ヒルドイドローション0.3% 25g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(加-工) 5ml	0:通常	
2:外用薬	ファンギゾンシロップ含嗽水	0:通常	
2:外用薬	フィブラストスプレー(500)	0:通常	
2:外用薬	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	2:院内不可薬	
2:外用薬	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」40g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	フェルピナクパップ70mg「1-トク」(1袋=7枚)(セルタツチ)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」(テ`10テープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」(テ`10テープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」(テ`10テープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」(テ`10テープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニルエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」(フェントテープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニルエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」(フェントテープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニルエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(フェントテープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェンタニルエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」(フェントテープ°)	0:通常	
2:外用薬	フェントテープ0.5mg	0:通常	
2:外用薬	ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	1:院外不可薬	
2:外用薬	フラジール錠 250mg	0:通常	
2:外用薬	プラスチベース	0:通常	
2:外用薬	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	0:通常	
2:外用薬	フランドルテープ40mg	2:院内不可薬	
2:外用薬	プリビシー液0.02% 500ml (オパボン)	1:院外不可薬	

2:外用薬	プリベシー液0.1% 500ml (スパン)	1:院外不可薬	
2:外用薬	プリビナ液 0.05% 5ml	0:通常	
2:外用薬	プリゾラミト懸濁性点眼液1%「サド」(イブプロト)5ml	0:通常	
2:外用薬	フルメトロン点眼液0.1%「センシ」5ml (フルメト)	0:通常	
2:外用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	2:院内不可薬	
2:外用薬	フルタイドディスク (100)	0:通常	
2:外用薬	フルカガソフアラカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田」156噴霧用(アラミ)	0:通常	
2:外用薬	フルチカゾン点鼻液50μg「サイ」28噴霧用 (フルチ)	0:通常	
2:外用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	0:通常	
2:外用薬	フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用	2:院内不可薬	
2:外用薬	フルミスト点鼻液	1:院外不可薬	
2:外用薬	フルメトロン 0.02% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	フルメトロン 0.1% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	プレドニン眼軟膏 5g	0:通常	
2:外用薬	ブロー氏液 (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	プロクトセディル軟膏 (注入) 2g/個	0:通常	
2:外用薬	プロクトセディル軟膏 (塗布) 2g/個	0:通常	
2:外用薬	フロジン液5%(先発無) 30ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	プロスタンディン (リプル) 軟膏30g	0:通常	
2:外用薬	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	2:院内不可薬	
2:外用薬	プロトピック軟膏0.1% 5g	2:院内不可薬	
2:外用薬	プロナック点眼液5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	プロベト (白色ワセリン)	0:通常	
2:外用薬	プロムドメチルNa点眼液0.1%「ニット」(プロメチル) 5ml	0:通常	
2:外用薬	プロムドメチル塩酸塩吸入液0.2% 45ml(ビリスル)	0:通常	
2:外用薬	ベガモックス点眼液 0.5% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ベストロン耳鼻科用1% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ベストロン点眼用 0.5% 5ml	0:通常	
2:外用薬	ベセルナクリーム5%	0:通常	
2:外用薬	ベネトリン吸入液 0.5% 30ml	0:通常	
2:外用薬	ベノキシル点眼液 0.4% 5ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	ヘパリン点耳液 5ml (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	ハリア類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(ヒルトイ)100g	0:通常	
2:外用薬	ハリア類似物質油性クリーム0.3% (ヒルトイ) 25g	0:通常	
2:外用薬	ハリア類似物質ローション0.3%「日医工」	0:通常	
2:外用薬	ベピオゲル 2.5% 15g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ペロテックエロソル 100	0:通常	
2:外用薬	ペンタサ坐剤 1g	0:通常	
2:外用薬	ペンタサ注腸 1g (100ml/個)	0:通常	
2:外用薬	ポアラクリーム 0.12% 5g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ポアラ軟膏 0.12% 5g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ホウ酸	0:通常	
2:外用薬	ホクナリンテープ (0.5mg/枚)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ホクナリンテープ (1mg/枚)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ホクナリンテープ (2mg/枚)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ポビドリンパスタ軟膏(エーパスタ) 100g	1:院外不可薬	
2:外用薬	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	0:通常	
2:外用薬	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 50ml/本	0:通常	
2:外用薬	ボラザG軟膏	2:院内不可薬	
2:外用薬	ボラザG坐剤	2:院内不可薬	
2:外用薬	ポルトレンゲル 50g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ポルトレンサポ 25mg	0:通常	
2:外用薬	ポルトレンサポ 50mg	0:通常	
2:外用薬	ポルヒール (1ml 4瓶/セット)	0:通常	
2:外用薬	ホルマリン	0:通常	

2:外用薬	マーデュオックス軟膏 10g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	マイザークリーム0.05% 10g	0:通常	
2:外用薬	マイザークリーム0.05% 10g	0:通常	
2:外用薬	マイトマイシン眼科外用液用 2mg	1:院外不可薬	
2:外用薬	マクロゴール軟膏(ソルベース)	0:通常	
2:外用薬	ミオコルスプレー0.3mg	0:通常	
2:外用薬	ミケランLA点眼液2% 2.5ml	0:通常	
2:外用薬	ミケラン点眼液2% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ミケルナ配合点眼液 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ミドリンM点眼液0.4% 5ml	0:通常	
2:外用薬	ミドリンP点眼液 5ml	0:通常	
2:外用薬	ムコスタ点眼液UD2%	2:院内不可薬	
2:外用薬	メサデルム軟膏0.1% 5g	2:院内不可薬	
2:外用薬	メノイドコンビパッチ	2:院内不可薬	
2:外用薬	メプチンキッドエア-5μg吸入 100回	0:通常	
2:外用薬	メプチンキッドエア-10μg吸入100回	0:通常	
2:外用薬	メプチン吸入液ユニット30μg/0.3ml	0:通常	
2:外用薬	メプチン吸入液ユニット50μg/0.5ml	0:通常	
2:外用薬	モイゼルト軟膏0.3% 10g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	モイゼルト軟膏1% 10g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	モーステープ20mg 7枚/袋	2:院内不可薬	
2:外用薬	モースパップXR120mg 7枚/袋	2:院内不可薬	
2:外用薬	モキリノキシン点眼液0.5%「サト」(ハゲモックス)5ml	0:通常	
2:外用薬	ユーバスタコーワ 100g	0:通常	
2:外用薬	ユーバスタコーワ軟膏 30g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ユベラ軟膏 56g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ラクティオンパップ70mg 7枚/袋	2:院内不可薬	
2:外用薬	ラタチモ配合点眼液「ニット」2.5ml (ザラム)	0:通常	
2:外用薬	ラタチモ配合点眼液0.005%「SEC」2.5ml (ザラム)	0:通常	
2:外用薬	リザベン点眼液0.5%	2:院内不可薬	
2:外用薬	リドカインテープ18mg「NP」(ハッス)	1:院外不可薬	
2:外用薬	リドメックスコーワローション 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」(イセロ)	1:院外不可薬	
2:外用薬	リボスチン点眼液0.025% 5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	2:院内不可薬	
2:外用薬	リュウアト1%眼軟膏 3.5g(先発無)	2:院内不可薬	
2:外用薬	リンデロン-VGローション 10ml	0:通常	
2:外用薬	リンデロン-VG軟膏 5g	0:通常	
2:外用薬	リンデロン-Vローション 10ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	リンデロン液5ml(点耳)	2:院内不可薬	
2:外用薬	リンデロン液5ml(点鼻)	2:院内不可薬	
2:外用薬	リンデロン坐剤0.5mg	0:通常	
2:外用薬	リンデロンの点眼・点耳・点鼻液0.1% 5ml(点眼)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ルコナック爪外用液5% 3.5g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ルミガン点眼液0.03% 2.5ml	2:院内不可薬	
2:外用薬	ルリコナゾールクリーム1%「イワ」(ルリコン) 10g	0:通常	
2:外用薬	ルリコナゾール軟膏1%「イワ」(ルリコン) 10g	0:通常	
2:外用薬	ルリコンクリーム1% 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	ルリコン液1% 10ml	0:通常	
2:外用薬	ルリコン軟膏1% 10g	2:院内不可薬	
2:外用薬	レスキュラ点眼液0.12% 5ml	0:通常	
2:外用薬	レスタミンコーワクリーム1%	2:院内不可薬	
2:外用薬	レゾルシン(先発無)	2:院内不可薬	
2:外用薬	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(ムスタ)	0:通常	
2:外用薬	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニット」5ml (クベット)	0:通常	

2:外用薬	レルベア100エリブタ30吸入用	0:通常	
2:外用薬	レルベア200エリブタ30吸入用	0:通常	
2:外用薬	ロキソニンテープ100mg (1袋=7枚)	2:院内不可薬	
2:外用薬	ロキソニンテープ100mg「1-トリ」(ロキソ) 7枚入	0:通常	
2:外用薬	ロコアテープ 7枚/袋	2:院内不可薬	
2:外用薬	ロコイドクリーム0.1% 5g	0:通常	
2:外用薬	ロコイド軟膏 5g	0:通常	
2:外用薬	ロゼックスゲル0.75% 15g/本	2:院内不可薬	
2:外用薬	ロナセンテープ20mg	0:通常	
2:外用薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(先発無)	0:通常	
2:外用薬	亜硫酸ナトリウム(試薬1級)	1:院外不可薬	
2:外用薬	液状フェノール「ケンエー」	0:通常	
2:外用薬	塩化アルミニウム溶液 20% (院内) 100ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	塩化アルミニウム溶液☆40%(院内)100ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	強力ポステリザン(肛門注入) 2g/個	0:通常	
2:外用薬	強力ポステリザン(肛門塗布) 2g/個	0:通常	
2:外用薬	酸化亜鉛「ケンエー」	0:通常	
2:外用薬	小児用フルナーゼ点鼻液25µg 56噴霧用	2:院内不可薬	
2:外用薬	消毒用エタノール(丸石) 500ml	0:通常	
2:外用薬	消毒用エタノール液IP 5000ml	0:通常	
2:外用薬	硝酸イソルビドテープ40mg「EMEC」(ワソドテープ)	0:通常	
2:外用薬	新レシカルボン坐剤	0:通常	
2:外用薬	親水クリーム	0:通常	
2:外用薬	人工涙液マイティア	2:院内不可薬	
2:外用薬	生食点眼液 5ml (院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	生理食塩液PL「フー」(吸入) 100ml	0:通常	
2:外用薬	生理食塩液PL「フー」(洗浄) 100ml	0:通常	
2:外用薬	生理食塩液PL「フー」開栓用ダブル(洗浄)100ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	精製水(蒸留水)-1000ml	1:院外不可薬	
2:外用薬	精製水-うがい用	0:通常	
2:外用薬	大塚蒸留水20ml-耳浴用(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	大塚蒸留水20ml-消毒用(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	大塚蒸留水20ml-点鼻用(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	大塚生食注 20ml (吸入用)	0:通常	
2:外用薬	大塚生食注(洗浄用) 500ml	0:通常	
2:外用薬	大塚生食注(洗浄用広口) 500ml	0:通常	
2:外用薬	大塚生食注20ml (耳浴用)	0:通常	
2:外用薬	大塚生食注20ml (点鼻用)	0:通常	
2:外用薬	大塚生食注20ml -消毒・洗浄用(院内)	1:院外不可薬	
2:外用薬	注射用水PL「フー」開栓用ダブル 100mL	1:院外不可薬	
2:外用薬	日点アトロピン点眼液1%(先発無)	0:通常	
2:外用薬	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	0:通常	
2:外用薬	硫酸アルミニウム(試薬)	1:院外不可薬	